

Avertissements agricoles




BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL 175 F Régisseur Recettes D.R.A.F. CCP DIJON 35 00 28 D



☎ 80.22.19.38

EDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 9 - 12 avril 1990

COLZA*Protection sclérotinia des parcelles en pleine floraison***CEREALES***Traitement montaison pour les parcelles arrivant à 2 noeuds***COLZA**

Légère évolution des stades depuis le dernier bulletin (Samouraï = G1 - Ceres = de F1 à G1 - Darmor = de E à F1). A noter quelques symptômes de torsion de tiges (notamment sur Ceres) et de fissures voire éclatement de tiges (sans attaque de charançon de la tige). Ces symptômes peuvent être dus au froid.

MALADIES

SITUATION : Le risque sclérotinia débute pour les parcelles atteignant la pleine floraison.

Bon état des parcelles dans l'ensemble.

La cylindrosporiose reste peu importante en général. La pseudocercosporiose, ponctuellement observée, concerne essentiellement les feuilles de la base.

PRECONISATION :

Appliquer le traitement de protection sclérotinia "chute des premiers pétales" sur les parcelles atteignant la pleine floraison. Tenir compte de la présence éventuelle de cylindrosporiose ou de pseudocercosporiose ainsi que de la nécessité d'une action curative pour le choix du produit.

RAVAGEURS

SITUATION : On ne signale pratiquement pas de captures de charançon des siliques.

Quelques colonies de pucerons cendrés restent observées localement.

PRECONISATION :

La protection contre le charançon des siliques reste prématurée. Une intervention contre les pucerons cendrés peut être appliquée en présence d'au moins 2 colonies par mètre carré.

Pour les parcelles encore peu avancées, poursuivre la surveillance des méligèthes jusqu'à l'apparition des premières fleurs.

P.120

B L E

L'évolution de la végétation est également ralentie par les températures.

MALADIES

SITUATION :

Piétin-verse peu important dans l'ensemble avec toutefois quelques situations à risque assez fortement touchées.

La septoriose ne progresse pas.

L'oïdium, en stagnation, reste cependant fréquent.

La présence de quelques pustules de **rouille brune** est également assez fréquente.

PRECONISATION :

Les parcelles atteignant le stade 2 noeuds seront à protéger rapidement dès le retour de conditions "poussantes". Pour les parcelles moins avancées, seule une forte présence de piétin-verse ou d'oïdium justifie une intervention précoce.

RAVAGEURS

Quelques pucerons sont observés localement. Toute intervention est actuellement prématurée.

ORGES D'HIVER

Evolution également ralentie de la végétation.

MALADIES

SITUATION :

On observe une progression parfois marquée de la rhynchosporiose. L'helminthosporiose reste assez fréquente, ainsi que la rouille naine. L'oïdium, sans progresser, reste important. La présence de taches brunes est fréquente, notamment en cas de présence importante d'oïdium sur vieilles feuilles.

PRECONISATION :

La protection fongicide sera à réaliser dès le retour de conditions "poussantes", en particulier sur les parcelles atteignant le stade 2 noeuds.

*

*

*